


Gule stafylokokker

-en kommentar:

Henviser til interessant artikkel av kollega Tine von Hanno om gule stafylokokker i nr. 7/8-99 med kommentar av hudlege Theis Huldt-Nystrøm. Det hevdes blant annet at det neppe kan ha vært resistens for fucidin.

Jeg har mange års tjeneste i allmennpraksis og er nå ved mikrobiologisk avdeling i Telemark, Telelab.

Sommer og høst -99 har vi hatt en rekke prøver fra impetigo-lignende utslett, tildels med bulladannelse, det har vært oppvekst av gule stafylokokker som i ca. 80% av tilfellene har vært resistente for penicillin og mellom 15 og 30% resistente for fucidin., jfr. tabell.



En del pasienter er vellykket behandlet med fucidin lokalt, imidlertid har det vært tendens til recidiv, vi har da anbefalt lokal vask med antibakterielt middel 2-3 gr. daglig. Ved dypere og mere utbredte lesjoner har det vært behov for systemisk antibiotikabehandling med kloxacillin/dikloxacillin. Noen kolleger har brukt erytromycin, men vi har observert resistens også for dette preparatet, som jo kun er bakteriosstatisk og dermed resistensdrivende.

Denne «epidemien» har vært både i Vestfold og Telemark sommer/høst -99, fra desember synes det ikke å ha vært tilfeller ut over det normale.

Skien, 19/1 00
Nils Grude Telelab, 3705 Skien.
E-mail: nils.grude@telelab.no