

Tabell 1. Demografi, ankomst og forløp ved rusmiddelforgiftning behandlet ved Oslo legevakt før og etter flyttingen ut av sentrum

	Året etter flytting n (%)	Året før flytting n (%)	p-verdi	To siste år før flytting n (%)	p-verdi
Kjønn^a			0,006		0,069
<i>Menn</i>	1223 (73,4)	1534 (69,3)		2708 (70,9)	
<i>Kvinner</i>	444 (26,6)	680 (30,7)		1108 (29,9)	
Alder^{b,c}	34 (26 – 42)	32 (25 – 41)	< 0,001	33 (26 – 42)	0,021
Brakt med ambulanse	1101 (66,0)	1371 (61,9)	0,010	2505 (65,6)	0,83
Ankomst helg (lørdag/søndag)	558 (33,4)	704 (31,8)	0,28	1231 (32,3)	0,39
Ankomst natt (20:00 – 07:59)	885 (53,0)	1286 (58,1)	0,002	2134 (55,9)	0,048
Oppholdstid (t: min)^{b,d}	04:10 (02:07 – 06:46)	03:19 (01:46 – 05:46)	< 0,001	03:43 (01:55 – 06:10)	< 0,001
Behandling^e	203 (12,2)	365 (16,5)	< 0,001	635 (16,6)	< 0,001
Intubasjon	2 (0,1)	4 (0,2)	0,71	4 (0,1)	1,00
Sedasjon	27 (1,6)	35 (1,6)	1,00	50 (1,3)	0,44
Nalokson^f	140 (8,4)	237 (10,7)	0,19	435 (11,4)	< 0,001
Flumazenil	2 (0,1)	2 (0,1)	1,00	4 (0,1)	1,00
Videre tiltak			< 0,001		< 0,001
<i>Innlagt somatisk sykehus</i>	192 (11,5)	233 (10,5)	0,33	408 (10,7)	0,37
<i>Innlagt psykiatrisk sykehus</i>	106 (6,4)	109 (4,9)	0,054	180 (4,7)	0,012
<i>Ferdigbehandlet ved legevakten</i>	1186 (71,1)	1466 (66,2)	0,001	2630 (68,9)	0,11
<i>Forlot legevakten under behandling</i>	177 (10,6)	404 (18,2)	< 0,001	596 (15,6)	< 0,001
<i>Ukjent</i>	8 (0,5)	3 (0,1)		3 (0,1)	
Totalt antall tilfeller	1669 (100,0)	2215 (100,0)		3817 (100,0)	

Sensitivitetsanalyse på grå bakgrunn. P-verdier for sammenligning av året etter flytting med hhv. året før og de to siste årene før. Signifikante p-verdier ($p < 0,05$) i uthevet skrift.

^aData mangler for 2 tilfeller etter flytting, 1 tilfelle året før og 1 tilfelle de to årene før.

^bMedian (interkvartilområde).

^cData mangler for 40 tilfeller etter flytting, 33 tilfeller året før og 48 tilfeller de to årene før.

^dData mangler for 10 tilfeller året før flytting og 11 tilfeller de to årene før.

^eAll behandling utover ren observasjon.

^fDersom data begrenses til kun pasienter som hadde inntatt opioider: Året etter 115/592 (19,4 %). Året før 203/820 (24,8 %), $p = 0,021$. To år før 371/1506 (24,6 %), $p = 0,013$.