

Tabell 2. Kliniske funn ved rusmiddelforgiftning behandlet ved Oslo legevakt før og etter flyttingen ut av sentrum

	Året etter flytting n (%)	Året før flytting n (%)	p-verdi	To siste år før flytting n (%)	p-verdi
Bradypnoe (<i>RF</i> < 12/min)	113 (6,8)	146 (6,6)	0,88	266 (7,0)	0,84
Takypnoe (<i>RF</i> > 20/min)	135 (8,1)	162 (7,3)	0,40	266 (7,0)	0,16
Takykardi (<i>puls</i> ≥ 120/min)	125 (7,5)	227 (10,2)	0,004	367 (9,6)	0,013
Hypertensjon (<i>SBT</i> ≥ 180 mmHg)	28 (1,7)	23 (1,0)	0,083	36 (0,9)	0,020
Hypotensjon (<i>SBT</i> ≤ 90 mmHg)	25 (1,5)	34 (1,5)	0,93	52 (1,4)	0,70
Hypertermi (<i>temp</i> ≥ 39,0 °C)	5 (0,3)	1 (< 0,1)	0,046	6 (0,2)	0,28
Bevissthetsnivå ved ankomst^a			< 0,001		< 0,001
<i>GCS</i> 15	742 (44,9)	1118 (50,7)	< 0,001	1929 (50,7)	< 0,001
<i>GCS</i> 9–14	832 (50,4)	1018 (46,2)	0,012	1736 (45,7)	0,002
<i>GCS</i> 3–8	78 (4,7)	67 (3,0)	0,009	137 (3,6)	0,061
Laveste bevissthetsnivå^b			0,069		0,21
<i>GCS</i> 15	644 (38,7)	841 (38,6)		1469 (38,9)	
<i>GCS</i> 9–14	826 (49,7)	1034 (47,4)		1813 (48,0)	
<i>GCS</i> 3–8	192 (11,6)	305 (14,0)		497 (13,2)	
Oppkast	87 (5,2)	113 (5,1)	0,88	198 (5,2)	0,97
Hodepine	41 (2,5)	55 (2,5)	0,96	109 (2,9)	0,40
Angst	173 (10,4)	142 (6,4)	< 0,001	307 (8,0)	0,005
Hallusinasjoner	100 (6,0)	142 (6,4)	0,59	231 (6,1)	0,87
Agitasjon	299 (17,9)	396 (17,9)	0,98	680 (17,8)	0,93
Psykose	109 (6,5)	126 (5,7)	0,28	211 (5,5)	0,15
Kramper	16 (1,0)	20 (0,9)	0,86	34 (0,9)	0,81
Hjertebank	68 (4,1)	71 (3,2)	0,15	117 (3,1)	0,057
Brystsmerter	99 (5,9)	122 (5,5)	0,57	196 (5,1)	0,23
Arytmi	4 (0,2)	1 (< 0,1)	0,094	2 (0,1)	0,054
Totalt antall tilfeller	1669 (100)	2215 (100)		3817 (100)	

Sensitivitetsanalyse på grå bakgrunn. P-verdier for sammenligning av året etter flytting med hhv. året før og de to siste årene før. Signifikante p-verdier ($p < 0,05$) i uthevet skrift.

GCS: Glasgow Coma Scale skår; RF: respirasjonsfrekvens; SBT: systolisk blodtrykk; temp: temperatur.

^aData mangler for 17 tilfeller etter flytting, 12 tilfeller året før og 15 tilfeller de to årene før. ^bData mangler for 7 tilfeller etter flytting, 35 tilfeller året før og 38 tilfeller de to årene før.