

Tabell 3. Inntatte rusmidler ved rusmiddelforgiftning behandlet ved Oslo legevakt før og etter flyttingen ut av sentrum

	Året etter flytting n (%)	Året før flytting n (%)	p-verdi	To siste år før flytting n (%)	p-verdi
Amfetamin	327 (19,6)	400 (18,1)	0,23	731 (19,2)	0,70
Kokain	306 (18,3)	419 (18,9)	0,65	664 (17,4)	0,40
MDMA	86 (5,2)	107 (4,8)	0,65	162 (4,2)	0,14
Andre stimulanter	52 (3,1)	54 (2,4)	0,20	61 (1,8)	0,001
Heroin	387 (23,2)	613 (27,7)	0,002	1185 (31,0)	<0,001
Metadon	22 (1,3)	36 (1,6)	0,44	68 (1,8)	0,21
Buprenorfin	9 (0,5)	12 (0,5)	0,99	20 (0,5)	0,94
Andre opioider	201 (12,0)	182 (8,2)	< 0,001	274 (7,2)	<0,001
Benzodiazepiner	518 (31,0)	614 (27,7)	0,024	1064 (27,9)	0,017
GHB	134 (8,0)	194 (8,8)	0,42	411 (10,8)	0,002
Cannabis	296 (17,7)	347 (15,7)	0,18	607 (15,9)	0,092
Ketamin	77 (4,6)	80 (3,6)	0,12	120 (3,1)	0,007
Hallusinogener	31 (1,9)	47 (2,1)	0,56	94 (2,5)	0,17
Andre/ukjent	202 (12,1)	308 (13,9)	0,10	432 (11,3)	0,40
Alkohol^a	584 (35,0)	722 (32,6)	0,13	1260 (33,0)	0,16
Totalt antall tilfeller	1669 (100)	2215 (100)		3817 (100)	

Sensitivitetsanalyse på grå bakgrunn. P-verdier for sammenligning av året etter flytting med hhv. året før og de to siste årene før. Signifikante p-verdier ($p < 0,05$) i uthvet skrift.
GHB: gamma-hydroksybutyrat; MDMA: 3,4-metylendioksymetamfetamin.

^aSom tilleggsagens til andre rusmidler. For rene alkoholforgiftninger se tabell 4.